



Det handler om tid

Ambulancen...



...når sjældent frem i tide

**For hvert minut stødet forsinkes
falder chancen for overlevelse med 10%**



Hurtig indsats er afgørende...

Ambulance Responstid

Best case scenario

Opdage og registrere ulykken	1 minut
Ringe 112	1 minut
Alarmere ambulance personalet (alarmcentral)	30 sekunder
Ambulancemand til ambulance	30 sekunder
Køretid til skadested	8 minutter
Tage udstyr og medbringe dette til patienten	2 minutter
Ankomst patient / defibrillator/ afgive stød	1 minut
TOTAL	14 minutter

*

**


Hjertestartere

Effektive

overlevelse



HLR



0-5%



HLR +


Hjertestarter



30-70%

Ventrikelflimren

“Elektrisk anarki”




>50% af alle
pludselige hjertestop
starter med VF

Behandling af VF

Defibrillering

"kick-start" af hjertet

"strøm"



Hjertestartere



Hvad er en hjertestarter/AED?




Hjertestartere


Sikre

Anbefaler kun stød
hvis der er en
stødbar hjerterytme

Stød anbefales



Stød anbefales ikke



Lovgivning i DK

- ♥ **Sundhedsstyrelsen godkendte den 18. marts 2003, at lægfolk må bruge hjertestartere**

Handlingsplan for brug af hjertestarter

- 1. Beslut at bruge hjertestarter (livstegn?)**
- 2. Aktivér hjertestarter**
- 3. Følg instruktioner fra apparatet**



Når AED Plus er på stedet



**Tryk på
“TÆND”
Knappen**

Når AED Plus er på stedet



ÅBEN




Klargør brystkasse (hvis nødvendigt)

- ✓ Barber hår af hvor elektroder placeres
- ✓ Tør området af hvor elektroder placeres



Rør ikke patienten – analyserer





Advarsel

Spørsmål ???????????




0 til 1 år



Med 2 finger
presses brystkassen
ca 1/3 ned = 2-3 cm

1 år til 8 år




Med 1 hånd
presses
brystkassen
3-4 cm ned

Fremmedlegemer i luftvejen – børn ved bevidsthed

Spædbørn (0-1 år)



Der gives op til 5 kraftige dunk i ryggen,
midt mellem skulderbladene, med håndroden



Småbørn (1-8 år)

Der gives op til 5 kraftige dunk i ryggen,
mellem skulderbladene.

Kan barnet placeres, så der er frie luftveje og hovedet samtidig
vender nedad

Ellers Heimlich's metode

